

Planificador de Huerta

Recomendaciones para los principales cultivos hortícolas que pueden desarrollarse en una huerta familiar ubicada en la zona sur de Santa Cruz. Las fechas son orientativas.



Especie	Fecha de siembra / plantación	Fase lunar para sembrar	Respuesta ante heladas	Sistema de producción	Característica específica	Forma de siembra/plantación	Escalonamiento recomendado	Ubicación en la huerta	Tolera sombra	Período crítico a la falta de agua	Dist. entre plantas x dist. entre líneas	Asociar con	Rotar con	Labores culturales	Cultivo en maceta	Período posible y forma de cosecha	Años de poder germinativo	Recuperación de semillas	Especie
Ajo	mitad de abril	☾ / menguante y nueva	resistente	aire libre con o sin mulching	bianual / riego localizado o por surco	directa a golpe	no	cantero	no	formación del bulbo	10x35 cm	lechuga remolacha tomate	legumbres hojas raíces	cortar chala o descolar o atar	si	enero (250 días aprox.) hojas amarillentas que se doblan hacia abajo	1	guardar las mejores cabezas	
Frutilla	sept.-dic.	☾ menguante	resistente	bajo cubierta	perenne - riego localizado o por surco	a 3 bolillos	no	cantero	no	formación de botones florales y desarrollo de fruto hasta madurez	30x30 cm	acelga lechuga espinaca	bulbos raíces legumbres	acolchar con pasto seco bajo frutos y cortar brotes	si	oct. - abril fruto maduro	3		
Espinaca	sept.-enero	☾ creciente	resistente	aire libre / bajo cubierta	anual	directa a chorrillo / al voleo	20 días	cantero	si	2 semanas antes de la madurez	5x35 cm	coles remolacha	bulbos raíces legumbres	carpir ralear	si	nov. - marzo cortar planta entera o las hojas externas	4	dejar planta entera amarillenta	
Acelga	agosto a marzo		resistente	aire libre / bajo cubierta	bianual	directa a chorrillo / almácigo y trasplante	30 días	cantero	si	14 a 21 días antes de la floración	15x25 cm	cebolla repollo lechuga	legumbres	ralear	si	todo el año a partir de que presenta 5-6 hojas. Planta entera o las hojas externas	4	cortar los tallos florales que se van secando	
Lechuga	sept.		resistente	aire libre / bajo cubierta	anual/ suelo con temp. sup. a 2°C para germinar.	directa / almácigo al voleo y trasplante	15 días	cantero	si	humedad en siembra, sobre todo antes de la cosecha	15x25 cm	bulbos - raíces coles - acelga	bulbos raíces legumbres	ralear	si	octubre - feb. planta entera u hojas externas	4 a 6	cortar la espiga una vez seca la planta	
Perejil	sept.-marzo		resistente	aire libre / bajo cubierta	anual	directa al voleo apretado	30 días	cantero	si	20 días antes de la cosecha y después de cada corte	1x30 cm	tomate - coles lechuga - acelga	bulbos raíces legumbres		si	cortar hojas tiernas 5 cm del suelo	2	recolectar las flores cuando se secan	
Rabanito	feb.-abril / sept.-dic.	☾ entre menguante y nueva	resistente	aire libre / bajo cubierta	anual	directa a chorrillo	15 días	cantero/ cabeceras	no	durante el engrosamiento de la raíz	5x30 cm	zanahoria hojas arveja	bulbos raíces legumbres	carpir ralear	si	todo el año 30 a 40 días raíz tierna	4	dejar ir en vicio, cortar plantas enteras secas	
Remolacha	nov.		resistente	aire libre	bianual/ suelo fértil y suelto	directa a chorrillo	30 días	cantero	no	4 semanas después de la emergencia	10x35 cm	coles - cebolla rabanito - apio lechuga	bulbos raíces legumbres	aporcar carpir ralear	no	dic. - enero raíz formada 6 a 8 cm antes que florezca	4 a 6	cortar los tallos florales que se van secando	
Zanahoria	nov.		resistente	aire libre	bianual/ suelo fértil y suelto	directa a chorrillo	30 días	cantero	no	los primeros 40 días desde la siembra	5x40 cm	lechuga - cebolla puerro - arveja	bulbos raíces legumbres	aporcar carpir ralear	no	enero - feb.	3	recolectar las flores cuando se secan	
Cebolla de verdeo	sept.		resistente	aire libre / bajo cubierta	bianual	almácigo y trasplante (10-15cm de alto y 0,5 de diámetro)	30 días	cantero	no	durante la siembra y trasplante	10x35 cm	coles - remolacha lechuga - tomate	raíces hojas legumbres	cortar tallos florales aporcar	si	enero - feb. planta entera antes que florezca	2	cortar varas florales cuando abren los primeros capullos	
Puerro	sept.		resistente	aire libre / bajo cubierta	bianual	almácigo y trasplante (10-15cm de alto y 0,5 de diámetro)	30 días	cantero	si	todo el ciclo, antes y durante el período de cosecha	5x40 cm	zanahoria apio lechuga	raíces hojas legumbres	aporcar	si	enero - feb. planta entera antes que florezca	2		
Brocoli / Coliflor	sept.		☾ creciente	resistente	aire libre	anual	almácigo, a golpe y trasplante	30 días	cantero	no	formación y crecimiento de la cabeza	40x70 cm a 3 bolillos	lechuga puerro cebolla salvia zanahoria romero	bulbos raíces legumbres	aporcar carpir	no	dic - feb. cortar cabezas florales antes de abrirse	2	arrancar planta entera amarilla
Repollo	sept.	☾ creciente	resistente	aire libre	bianual	almácigo, a golpe y trasplante	30 días	cantero	no	formación y crecimiento del repollo	40x70 cm a 3 bolillos		bulbos raíces legumbres	aporcar carpir	no	dic. - mayo cabeza formada apretada	4	recolectar vainas secas	
Haba	nov.	☾ menguante	resistente	aire libre	anual	directa a golpe	30 días	cantero	no	floración y cuajado de vainas	25x70 cm	zanahoria - ajo coles - rabanito	frutos (tomate - pimiento) hojas	despuntar a 40 cm aporcar carpir tutorar	no	feb. - marzo vaina tierna con grano grande	4	cortar vainas secas o de color amarillento	
Radicheta	sept.-dic.	☾ creciente	resistente	aire libre / bajo cubierta	bianual	directa a chorrillo	30 días	cantero	si	2 semanas antes de la madurez	1x35 cm	coles - zanahoria remolacha - ajo	bulbos raíces legumbres		si	dic. - enero hojas tiernas al ras del suelo	3 a 6	cortar planta entera amarillenta	
Rúcula	sept.-oct.	☾ creciente	resistente	aire libre / bajo cubierta	anual	directa al voleo / chorrillo	30 días	cantero	si		1x30 cm	zanahoria apio	bulbos raíces legumbres		si	nov. - dic. hojas tiernas a 5 cm del suelo	4	cortar plantas con frutos amarillos	
Arveja	nov.	☾ menguante	resistente	aire libre	anual	directa a golpe	30 días	cerco/cantero con tutor	no	inicio de floración y llenado de vainas	5x20 cm	zanahoria - coles ajo - rabanito	frutos bulbos raíces	tutorar aporcar	si	enero - feb. vaina tierna con grano tierno	3	arrancar planta entera con vaina amarillenta	
Papa	mitad de octubre	☾ / menguante y nueva	sensible	aire libre	anual	directa a golpe	no	cantero	no	inicio de floración y desarrollo del tubérculo	20x70 cm	rabanito coles lechuga	bulbos hojas legumbres	aporcar	no	feb. - marzo planta marchita se desentierren las papas			
Albahaca	almácigo en agosto	☾ creciente	muy sensible	bajo cubierta	anual	almácigo al voleo y trasplante	30 días	cantero	si	siembra y floración	20x35 cm	tomate - zanahoria lechuga - rabanito	bulbos raíces legumbres	cortar tallos florales	si	50-70 días	1 a 2	juntar varas florales antes que se abran	
Tomate	almácigo en agosto		muy sensible	bajo cubierta	anual	almácigo a golpe y trasplante con pan de tierra	30 días	cantero con tutor y buena exposición solar	no	durante el cuajado del fruto	20x80 cm	albahaca lechuga	bulbos hojas legumbres	tutorar - aporcar desbrotar deshojar	si	feb. - marzo fruto maduro	4 a 5	sacar las semillas del fruto maduro. Dejar fermentar en su pulpa. Lavar y secar	
Pimiento	almácigo en agosto		sensible	bajo cubierta	anual	almácigo y trasplante con pan de tierra	30 días	cantero	no	inicio de floración, formación y desarrollo de fruto	40x70 cm	zanahoria - copete rabanito - albahaca	bulbos hojas legumbres	tutorar aporcar	si	marzo - abril fruto con la madurez deseada	1 a 3		
Zapallito	nov.-dic.		sensible	aire libre / bajo cubierta	anual	almácigo y trasplante con pan de tierra / directa a golpe	15 días	cantero	no	floración y formación del fruto	80x80 cm	acelga	legumbres	aporcar carpir	no	feb. - marzo fruto verde claro de 5 a 10 cm de diámetro	5		
Pepino	almácigo en agosto		muy sensible	bajo cubierta	anual	directa a golpe 2 o 3 semillas	30 días	cantero/cerco	no	de floración a cosecha	60x90 cm	rabanito	legumbres	tutorar - despuntar con 6 hojas para favorecer guías	no	enero - feb. fruto tierno	5		
Apio	oct.-nov.		resistente	aire libre	bianual	almácigo al voleo y trasplante	30 días	cantero	si	inicio del cultivo hasta comienzo de la madurez	20x40 cm	puerro tomate	raíces bulbos legumbres	aporcar (blanqueo)	si	feb. - marzo hoja por hoja o planta entera	5		recolectar las flores cuando se secan