

Evaluación del Creep Feeding en corderos Corriedale criados en sistemas extensivos.

III. Aceptabilidad de la carne

Bain, I.^{1*}; Vargas, P.²; Andrade, M.²; Acuña, S.¹; Inchausti, C.³.

bain.ingrid@inta.gob.ar

¹INTA EEA Chubut, Trelew, Chubut. ²INTA EEA Santa Cruz.

³Alimentos Balanceados CRECER S.A.



Corderos Corriedale

- **Lote Testigo (LT):** 80 corderos + madres, pastizal natural
- **Lote Creep Feeding (CF):** 92 corderos + madres, pastizal natural + suplementación (18%PB; 2,9 Mcal EM/kg MS).

A las 24 horas de la faena:

- ✓ Muestras de 30 corderos seleccionados al azar (LT=15 y CF=15)

Estudio de consumidores (Trelew – Chubut)

- ✓ m. *Longissimus dorsi*. Temp. interna de cocción: 80 °C
- ✓ 84 Consumidores




➤ **Aceptabilidad: Olor, Terneza, Sabor, General**

➤ Encuesta de opinión


ANVA con tratamiento como efecto fijo. Comparación de medias: través de la prueba de Bonferroni ($P \leq 0,05$).

Correlaciones de Pearson entre parámetros de aceptabilidad.



*Escala: 1=me desagrada extremadamente, 8=me gusta extremadamente

Preferencias respecto al sistema de alimentación de los animales (encuesta de opinión)



- ✓ Sistema de alimentación no afectó la aceptabilidad de carne.
- ✓ Sabor: atributo determinante de la aceptabilidad general.
- ✓ Factibilidad de la suplementación exclusiva de corderos, sin alterar la aceptabilidad de los consumidores.