



FICHA VARIETAL

# Pera **Beurré de Jonghe**

Originada alrededor de 1865 en Bélgica. Se la puede encontrar con el nombre de Jonghes Butterbirne (2).

El árbol es medianamente vigoroso y productivo.

En el Alto Valle alcanza su madurez en la segunda quincena de febrero. La floración es intermedia la plena floración se produce alrededor del 29 de septiembre.

El fruto es cónico globoso, simétrico a ligeramente asimétrico, de tamaño pequeño. La epidermis es verde amarillenta con color superficial en tono rosado en una superficie pequeña a mediana (menor del 50%). El pedúnculo se encuentra inserto como una prolongación del eje.

En cuanto a sus características sensoriales, es una variedad con jugosidad baja a media. De sabor medianamente intenso donde predomina el dulzor con baja acidez y astringencia.


Su principal uso es para consumo en fresco (1).

(1) Bunyard, E. A. 1920. A handbook of hardy fruits more commonly grown in Great Britain. John Murray, Albemarle Street, London.

(2) Welkerling de Tacchini E. 1967. Descripción de los Cultivares de Peral. Colección Agropecuaria N. 15. INTA.




INTA - FICHA VARIETAL



INTA - FICHA VARIETAL



INTA - FICHA VARIETAL



INTA - FICHA VARIETAL