

BATATA

para
industria

Hortalizas
para
industria

ISSN 2718- 8795

N° 6 - 2021

Cultivares a elegir

Morada INTA: piel morada, pulpa amarilla con mecha, seca. **Arapey:** piel morada, pulpa cremosa amarilla, seca. **Beauregard:** piel cobriza, pulpa anarajada, húmeda. **Okinawa 100:** piel crema, pulpa blanca. **Colorada INTA:** piel morada clara, pulpa amarilla con mecha. **Boni INTA:** piel y pulpa anaranjada, semihúmeda. **GEM:** piel blanca.

Zona	Fechas preparación almácigo	Fechas óptimas de trasplante	Fechas óptimas de cosecha
Oasis Norte	Julio/Agosto	Octubre/Diciembre	Enero/Mayo
Valle de Uco	Agosto/Septiembre	Noviembre/Diciembre	Febrero/Mayo
Zona Sur	Septiembre	Noviembre/Diciembre	Febrero/Mayo
Zona Este	Julio/Agosto	Octubre/Diciembre	Enero/Mayo

Formas de siembra/trasplante

Distancia entre hileras a una cara

Distancia entre plantas

Centro Regional Mendoza - San Juan
Estación Experimental Agropecuaria Mendoza
Agencia de Extensión Rural Guaymallén



Autores: -Clara Contardi - EEA Mendoza
(contardi.clara@inta.gob.ar)

-Laura Lafalla Manzano

Diseño y compaginación: Ignacio Sarmiento

Proyecto de
Encadenamiento Hortícola
Universidad y Desarrollo
Local 2017

Preparación del suelo

2 aradas, 2 rastreadas cruzadas y formación de camas de siembra.

Labores culturales requeridas

1 aporque de tierra alejando la planta del surco de riego. Riegos según demanda (depende del clima y suelo), suspendiendo un mes antes de la cosecha. Escardillados según necesidad hasta que la planta cierre el surco y ahogue las malezas. Es un cultivo tolerante a la sequía.

Plagas con mayor incidencia

Naupactus (*Naupactus* sp.);
Taladrillo (*Typophorus nigritus*).

Enfermedades más comunes

Hongos del suelo que afectan a las raíces engrosadas formando galerías internas y acorchamiento. Virosis múltiples.

Forma de cosecha Manual.

Conservación Hasta 6 meses.

Acondicionamiento para transporte Tacos de 20 kg para fábrica.

Particularidades a tener en cuenta y recomendaciones

Una vez que las raíces engrosadas maduran (entre 110 a 150 días) se puede cosechar. Para consumo en fresco, se arranca sólo lo que se vende en el día, se lava y embolsa por 10 kg. Para fábrica se cosecha todo junto y de manera tardía para permitir mayor peso de las raíces.



Arapey



Morada INTA