

Durante el servicio, son importantes los repuntes periódicos ya que en nuestra zona los cuadros son de superficies extensas. Podemos encontrar piños sin carneros o varios carneros en un piño. Recordar que en las ovejas el celo dura de 24 a 36 horas y en las borregas de 2 a 15 horas. Las borregas son más tímidas que las ovejas y tienen más celos ocultos (mudos e invisibles) que no son detectados por los carneros.



Repuntes periódicos

En cuanto a la época más propicia para encarnerar, se debe tomar en consideración lo siguiente:

La aptitud fisiológica de la majada para el apareamiento, el conocimiento de la extensión de la temporada reproductiva. El período de servicio determinará los momentos de parición, con lo cual se deberán tener en cuenta las condiciones climáticas probables durante los nacimientos. Tener presentes las variaciones estacionales de la oferta forrajera para asegurarnos de cubrir los requerimientos nutricionales de los animales.

También es importante considerar el desarrollo corporal de los futuros corderos y la época más conveniente para su venta.

Ganadería ovina extensiva

Se acerca el momento del SERVICIO



Antes de encarnerar, el INTA San Julián le recuerda:

Es una fecha muy importante para lograr un buen manejo en las majadas de cría, condicionando las demás actividades como por ejemplo la esquila preparto.

AER Pto. San Julián
Av. San Martín N°1284

☎ (02962) 452081

www.inta.gob.ar/puertosanjulian

📘 INTA AER San Julián

Autores

Med. Vet. Marcelo Aguilar
Tec. Prod. Agrop. Roberto Alvarez
Ing. Agr. Diana Ceccato

Se debe tener en cuenta que son necesarios algunos trabajos previos como: la revisión de hembras, principalmente el control de la boca y ubres. Un buen momento para esto, es durante la señalada y el destete.

En el periodo de servicio, las ovejas y los carneros deben tener una buena condición corporal, esto se verá reflejado en los porcentajes de preñez y señalada.

Los carneros a utilizar deberán ser aptos clínicamente y negativos a brucelosis ovina.



Revisación clínica de reproductores

Antes de la largada de carneros, se debe realizar la desparasitación interna/externa a toda la majada

Se deberán elegir las borregas que van a ser enviadas a servicio. El desarrollo corporal y el peso vivo, que debería ser superior a los 35 kg., determinarán la madurez sexual, siendo relevantes para obtener buenos índices en esta categoría.



Elección de borregas a primer servicio. PV y desarrollo

Para lograr lotes de corderos con desarrollo uniforme, lo recomendable es que el servicio tenga una duración de 50/55 días, ubicado en la época más favorable. Si tenemos en cuenta que entre celo y celo transcurren 17 días, las hembras tendrán 2 o 3 oportunidades de quedar servidas.



Lote de corderos con desarrollo uniforme

En cuanto al porcentaje de carneros a utilizar, este, va a depender principalmente del tamaño y de la topografía de los cuadros y de sus características. En cuadros chicos y llanos es posible disminuir el porcentaje y en aquellos más quebrados, aumentarlo. La asignación debería estar entre el 2 y 4 % de machos.