

ESPINACA

para
deshidratado

Hortalizas
para
industria

ISSN 2718- 8795

N° 3 - 2021

Cultivares a elegir

Siena y Bassoon (Semillas Emilio S.R.L.), Mody y Saga (Garde Giusti Chuchuy S.A.).

Zona	Fechas óptimas de siembra	Fechas óptimas de cosecha
Oasis Norte	Febrero a Agosto	Mayo a Noviembre (90 días de ciclo)
Valle de Uco	Enero a Agosto	Abril a Noviembre
Zona Sur	Febrero a Agosto	Mayo a Noviembre (90 días de ciclo)
Zona Este	Febrero a Agosto	Mayo a Noviembre (90 días de ciclo)

Formas de siembra

Siembra directa, preferentemente mecanizada. Sembradora neumática o a chorrillo.

Densidad de plantación

700.000 a 800.000 pl/ha.

Distancia entre hileras

0,75 m

Distancia entre plantas

52 semillas por metro lineal.

Preparación del suelo

Subsolado, cincelado, incorporación de abonos (7.000 kg de Guano compostado/ha) y fertilizantes (200 kg de 18-46-00/ha), rastreada cruzada (la última perpendicular a la dirección de los surcos).

Centro Regional Mendoza - San Juan
Estación Experimental Agropecuaria Mendoza
Agencia de Extensión Rural Guaymallén



Autores: -Germán Horn - Cooperativa La Terre
(agropampahg@gmail.com)

-Laura Lafalla Manzano

Diseño y compaginación: Ignacio Sarmiento

Proyecto de
Encadenamiento Hortícola
Universidad y Desarrollo
Local 2017

Labores culturales requeridas

A los 45 días de la siembra, incorporar 150 kg de sulfato de amonio por hectárea.

Plagas con mayor incidencia

Gusanos (*Agrotis* sp.), Pulgones y Mosca Blanca (*Bermisia tabaci*).

Enfermedades más comunes

Peronóspora (*Peronospora farinosa*), Cercóspora, Stemphylium (*S. botriosum*), Cladosporium (*C. variable*), Antracnosis (*Colletotrichum dematicum*), Dumping Off (*Pythium* sp., *Fusarium* sp., *Rhizoctonia* sp.).

Formas de cosecha

Mecanizada o manual con lienzos o cajas cosecheras.

Acondicionamiento para transporte

A granel o en bins.

Particularidades a tener en cuenta y recomendaciones

Productos fitosanitarios permitidos:

Herbicidas: S-metalaclo-ro (Dual Gold) Sethoxidim (Poast).

Insecticidas: Imidacloprid (Confidor), Lamdacialotrina (Karate), Carbaryl (Sevin), Spinosad (Tracer), Acetamiprid (Mospilan).

Fungicidas: Azoxistrobina (Amistar), Carbendazim, Mancozeb.

