

FICHA VARIETAL

Pera **Beurré Hardy**

Obtenida por M. Bonnet en Boulogne-sur-mer, Francia, alrededor de 1920. Fue llamada Hardy en honor al director de los jardines de Luxemburgo. Se la puede encontrar con los siguientes sinónimos: Gellert`s Butterbine y Hardy (1, 2, 3).

El árbol es vigoroso y productivo. Es compatible con los portainjetos de membrilleros por lo que puede ser utilizado como interinjerto o filtro entre las variedades incompatibles y éstos.

Presenta una cosecha tardía. En Alto Valle alcanza el momento de cosecha a fines de febrero o principio de marzo.

En nuestra región alcanza el estado de plena floración el 27 de septiembre. Presenta flores de tamaño medio, con pétalos ovalados y separados; el estambre su ubica por debajo de los estambres.

El fruto es grande, cónico piriforme, ligeramente asimétrico. La epidermis es amarilla, desarrolla color superficial naranja-rojizo en un área muy pequeña del mismo. Presenta russeting. El pedúnculo se inserta en forma oblicua.

Se cita como una variedad de pulpa de tipo mantecosa, firme, jugosa, dulce y acidulada (3).

Principalmente consumida en fresco. En cosechas tardías puede manifestar decaimiento interno (2).

(1) Bunyard, E. A. 1920. A handbook of hardy fruits more commonly grown in Great Britain. John Murray, Albemarle Street, London.

(2) Hartman, H. 1957. Catalog and evaluation of the pear collection at the Oregon Agricultural Experiment Station. Oregon State College, Corvallis.

(3) Welkerling de Tacchini E. 1967. Descripción de los Cultivares de Peral. Colección Agropecuaria N. 15. INTA.

