

# El botiquín sanitario caprino

Es indispensable que los productores caprinos puedan disponer de esta herramienta en los corrales para realizar un buen manejo sanitario de la majada. A continuación se presentan recomendaciones generales para su uso.



## El Botiquín sanitario

Es de utilidad que los productores tengan en su casa a disposición un botiquín con los elementos básicos desde medicamentos e insumos como guantes, jeringas, agujas, entre otros elementos, para poder actuar frente a enfermedades comunes que afectan a sus **ANIMALES CAPRINOS**.

Para esto, lo más importante es saber cómo y cuándo uso tal medicamento (antibióticos, antiinflamatorios, cura bicheros entre otros) .y por eso aquí te ayudamos con las vías de administración y dosis de los medicamentos básicos.

### ¿Cómo utilizo los medicamentos del Botiquín sanitario?

**Por vía intramuscular:** se coloca en el musculo de la pierna. Por ejemplo, este es el caso de la mayoría de los antibióticos.



**Por vía subcutánea:** se coloca entre cuero y carne en la zona de la paleta. Por ejemplo los antiparasitarios y las vacunas.



**Por vía intravenosa/endovenosa:** lo ponemos dentro de la vena de cuello (yugular) del animal. Por ejemplo los antiinflamatorios.



**Por vía oral:** se administra por la boca ya sea pastillas o líquidos. Por ejemplo el Albendazol.



**¿Cuándo usar ANTIINFLAMATORIOS y de qué modo?**

#### **Dexametasona**

Se coloca en caso de infecciones después del parto, intoxicaciones, problemas de piel, golpes y picaduras.

Se aplica en forma inyectable, intramuscular o endovenosa

**Dosis:** 1ml cada 10kg de peso

#### **Oxitocina**

Se coloca luego de partos complicados para así ayudar a contraer los músculos y expulsar las pares.

Se aplica en forma inyectable intramuscular

**Dosis:** 1cm por cabra, se puede repetir cada 1 hora hasta lograr el efecto.

**¿Qué medicamentos puedo encontrar en el botiquín sanitario y como usarlos?**

#### **ANTIPARASITARIOS EXTERNOS**

Pour-on

Se aplica apretando el envase hasta que el líquido llegue al nivel de la primera línea del vaso dosificador (5cm) y se vierte a lo largo de todo el lomo del animal empezando desde las paletas hasta la cola.

## **ANTIPARASITARIOS INTERNOS**

### **Ivermectina**

Se aplica para controlar los parásitos internos, lo ideal es que se desparasite dos veces al año: en marzo y septiembre. En forma inyectable intramuscular.

**Dosis:** 0,5 ml por animal

### **Closantel**

Sé aplica para controlar enfermedades causadas por parásitos ejemplo: gusano del asta. En forma inyectable intramuscular

**Dosis:** 1ml cada 10 kg de peso vivo

### **Albendazol**

Se aplica para controlar los parásitos sobre todos aquellos que se instalan en intestino o tripas (gastrointestinales). Administración oral

**Dosis:**1 ml cada 10Kg de peso

**Estas tres drogas son las de mayor uso para desparasitar, lo que se recomienda es ir rotando su uso, es decir un año uso una el siguiente otra y así sucesivamente.**

## **ANTIBIOTICOS**

### **De larga acción:**

#### **Terramicina**

Se coloca cuando hubo problemas para largar la placenta (pares) luego del parto, cuando las ubres están calientes y duras, en moquillos, en casos de pizotas graves o granos de las pezuñas.

Se aplica en forma inyectable intramuscular.

**Dosis:** 4 cm cabra grande

6 cm chivo grande

2 cm cabrillona

1 cm cabritos

## Penicilina

Se coloca en caso de ubres enfermas o en moquillos. Es el recomendado para tratar estas enfermedades. En forma inyectable intramuscular.

**Dosis:** 1cm cada 10kg de peso.

## Recomendaciones claves para el uso del botiquín

Usar siempre **GUANTES** para retirar animales muertos del corral, restos de pares y animales abortados.

La ropa que se usa en los corrales dejarla colgada al sol. **NO SE DEBE LLEVARLA A LA CASA.**

Lavar la ropa usando **CREOLINA** disuelta en agua para desinfectar.

En caso de alguna duda sobre el uso de los medicamentos consultar al **VETERINARIO.**

No exponer los medicamentos al Sol, mantenerlos en un lugar **OSCURO Y FRESCO..**

También es importante que:

No se debe dejar que otros animales coman los animales muertos o restos de desperdicios luego de faenar.

**ENTERRAR** los fetos y demás desperdicios cubiertos con cal.