



FICHA VARIETAL

Manzana Cox Pomona

Antigua variedad difundida por Richard Cox en Buckinghamshire, Inglaterra, alrededor de 1825. Se presume que fue originada a partir de un seedling de la variedad Ribston Pippin. Se la puede encontrar citada con las siguientes sinonimias: Pomona de Cox, Hill's Seedling (1).

El árbol es medianamente vigoroso, de producción moderada y regular. En el Alto Valle presenta una madurez medianamente temprana, en la segunda quincena de enero.

Alcanza la plena floración alrededor del 9 de octubre. La flor tiene un tamaño grande con pétalos blancos, ovalados y solapados. El estigma se encuentra por debajo de los estambres.

El fruto es globoso aplanado, mediano y simétrico. De epidermis amarilla, con un color superficial en un área mediana a alta de un tono rojo claro y estriado. Presenta numerosas lenticelas de color claro y de tamaño grande distribuidas de manera uniforme. El pedúnculo se encuentra inserto en ángulo recto con el eje, de longitud y grosor mediano. Se observa russet en la cavidad peduncular. La pulpa es de color blanco, firme y jugosa. De sabor ligeramente ácido y astringente.

Recomendada para usos culinarios y elaboración de sidras (1).

(1) Bunyard, E. A. 1920. A handbook of hardy fruits more commonly grown in Great Britain. John Murray, Albemarle Street, London.

