

Productos fitosanitarios para poscosecha de peras y manzanas Temporada 2015 / 2016

Tabla 1. Límites Máximos de Residuos para PERAS (Expresados en mg/kg ó ppm)

Principio activo	ARG	CODEX	RUSIA ⁽³⁾	USA	UE
Captan	15,0	15,0	3,0	25,0	3,0
Carbendazim ⁽¹⁾	1,0	3,0	0,05	NR	0,2
Difenilamina	3,0	5,0	5,0	5,0	0,1 ⁽⁴⁾
Etoxiquina	Coad	3,0	NR	3,0	0,05
Fludioxonil	5,0	5,0	0,7	5,0	5,0
Imazalil ⁽¹⁾	2,0	5,0	5,0	RST	2,0
Iprodione ⁽¹⁾	5,0	5,0	5,0	RST	6,0
Metil tiofanato ⁽²⁾	1,0	-	0,5	3,0	0,5
Pirimetanil	5,0	15,0	7,0	15,0	15,0
Tiabendazol	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0

Tabla 2. Límites Máximos de Residuos para MANZANAS (Expresados en mg/kg ó ppm)

Principio activo	ARG	CODEX	RUSIA ⁽³⁾	USA	UE
Captan	15,0	15	3,0	25,0	3,0
Carbendazim ⁽¹⁾	1,0	3,0	0,05	NR	0,2
Difenilamina	3,0	10,0	10	10,0	0,1 ⁽⁴⁾
Etoxiquina ⁽¹⁾	Coad	-	NR	RST	0,05
Fludioxonil	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Imazalil ⁽¹⁾	2,0	5,0	5,0	RST	2,0
Iprodione ⁽¹⁾	5,0	5,0	5,0	RST	6,0
Metil tiofanato ⁽²⁾	1,0	-	0,5	2,0	0,5
Pirimetanil	5,0	15,0	7,0	15,0	15,0
Tiabendazol	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0

NR: no registrado (aplica tolerancia cero).

RST: registrado pero sin tolerancia.

Coad: registrado como coadyuvante en el *Registro de aditivos alimentarios y coadyuvantes de tecnología*.

- (1) Principios activos restringidos para fruta con destino a jugo.
- (2) Este principio activo se degrada a Carbendazim y en los análisis de residuos se detectan ambas moléculas
- (3) Para Rusia, cuando figura NR se toma valor CODEX, o en su defecto LMR del país de origen de la fruta. Considerado según la interpretación de la legislación rusa, conforme a GN 1.2.1323-03 del MEMORANDUM "Relativo a la seguridad de productos de origen vegetal acordado entre la República Argentina y la Federación Rusa", punto 4.
- (4) Sustancia no aprobada según Reglamento 1107/2009. Se fija este valor como tolerancia temporal por contaminación cruzada vigente hasta Febrero/Marzo 2018.

Recuerde que los productos antiescaldantes etoxiquina y difenilamina no están autorizados en determinados mercados como el caso de la Unión Europea. Por ello, se recomienda que la fruta no se trate con estos productos cuando la intención es exportar a los mismos.

La utilización repetida de fungicidas de un mismo grupo químico facilita la aparición de cepas de hongos resistentes. Por ello, se recomienda rotar o mezclar fungicidas de diferentes grupos químicos en los programas de tratamiento (Tabla 3).

Tabla 3. Grupos químicos de los principios activos disponibles en poscosecha de peras y manzanas

Principio Activo	Grupo Químico	Función	Modo de Acción
Captan	Ftalimida	Contacto Preventivo	Inhibidor de la respiración
Carbendazim	Benzimidazol	Sistémico Preventivo Curativo	Inhibidor de la mitosis
Fludioxonil	Fenilpirrol	Contacto Preventivo	Bloquea la proteína quinasa: Inhibe la germinación de esporas y el crecimiento del tubo germinativo y micelio
Imazalil	Imidazol	Contacto y Sistémico Preventivo y Curativo	Inhibidor de la síntesis del ergosterol: Altera la función de la membrana e inhibe la esporulación
Iprodione	Dicarboximida	Contacto Preventivo	Inhibidor de la germinación de esporas y del crecimiento del micelio
Metil Tiofanato	Benzimidazol	Sistémico Preventivo Curativo	Inhibidor de la mitosis
Pirimetanil	Anilinyrimidina	Preventivo Curativo	Inhibidor de la biosíntesis de metionina: Previene la secreción de hongos de enzimas hidrolíticas proteasas
Tiabendazol	Benzimidazol	Sistémico Preventivo y Curativo	Inhibidor de la mitosis