



FICHA VARIETAL

# Pera **Beurré Sterckmans**

Obtenida por M. Sterckmans en Louvain, Bélgica, alrededor de 1820 (1, 2, 3).

El árbol es vigoroso y medianamente productivo. Presenta una madurez tardía, en el Alto Valle alcanza el momento de cosecha a fines de febrero-principio de marzo.

Tiene una floración tardía. El estado de plena floración se registra el 2 de octubre en la zona de Alto Valle. Presenta flores de tamaño mediano, con pétalos ovalados, anchos y separados; el estigma se ubica debajo de los estambres.

El fruto es piriforme de base ancha, ligeramente asimétrico, de tamaño pequeño a mediano. La epidermis es verde amarillenta con color superficial en tono rojo claro en una superficie pequeña (10-25%). El pedúnculo se encuentra inserto como una prolongación del eje, con curvatura débil, de longitud y grosor medio.

En cuanto a sus características sensoriales, es una variedad con una jugosidad media. De sabor y aroma con baja intensidad. Recomendada para consumo fresco (1).

- (1) Bunyard, E. A. 1920. A handbook of hardy fruits more commonly grown in Great Britain. John Murray, Albemarle Street, London.
- (2) Hartman, H. 1957. Catalog and evaluation of the pear collection at the Oregon Agricultural Experiment Station. Oregon State College, Corvallis.
- (3) Welkerling de Tacchini E. 1967. Descripción de los Cultivares de Peral. Colección Agropecuaria N. 15. INTA.

