

TIMBÓ

(*Enterolobium contortisiliquum*)

Familia: *Fabaceae*

Nombres comunes: pacará, oreja de negro, timbó colorado, cambá nambí



Regiones donde vive espontáneamente: En el noroeste y noreste de Argentina, en las selvas de las yungas, Misionera y en las selvas en galería de los ríos Paraguay, Uruguay, Paraná y afluentes, hasta el Delta en la provincia de Buenos Aires, en las formaciones de monte blanco hasta la ribera del Río de La Plata.

Forma de vida: Árbol.

Tamaño: 15 a 20 m de altura, puede alcanzar los 40 m en el norte del país.

Rasgos distintivos:

Copa grande, aparasolada o hemisférica, amplia, frondosa.

Fuste recto a levemente tortuoso, recubierto de una corteza cenicienta lisa en los ejemplares juveniles y agrietadas en los adultos, con abundantes lenticelas.

Follaje caducifolio.

Hojas compuestas, bipinnadas, alternas, de hasta 20 cm de longitud, con 2 a 7 pares de pinnas, éstas opuestas o subopuestas, con 5 a 21 pares de folíolos, cultriformes, pubescentes de 4 a 20 mm

de longitud.

Flores blancas, hermafroditas de 1-1,6 cm de largo en cabezuelas hemisféricas de 10 a 20 flores pedunculadas, dispuestas en racimos axilares.

Fruto legumbre comprimida, indehiscente, encorvada en semicírculo, arriñonada con forma de oreja, de 5 a 9 cm de diámetro, castaño negruzco brillante, subleñosa.

Semillas numerosas, duras, lisas, ovóides, castañas de 8-12 mm de longitud.





Propagación: Por semillas y estacas. Se debe realizar tratamiento pregerminativo con escarificación mecánica. Luego remojar las semillas por 24 hs y sembrar en bandeja o almácigo.

Fechas de Floración- Cosecha:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Flor										●	●	●
Fruto		●	●	●	●							

Observaciones: Crecimiento rápido. Requiere pleno sol y reparo de heladas. Prefiere suelos húmedos y neutros. No resiste las heladas inferiores a -3°C. Es muy apto para la poda. Los frutos permanecen en la planta durante el invierno. El fruto alimenta al mono carayá negro, el tapir y el pecarí de collar. También es planta hospedera de varias mariposas. Asimismo, se lo considera abortivo para el ganado vacuno.

Tanto la corteza como el fruto del timbó contienen abundante saponina, un producto que hace espuma en contacto con el agua, motivo por el cual los indígenas del norte de Argentina, de la etnia pilagá, lo utilizaban como jabón casero.

Aptitud apícola: Muy bueno.

Uso para cortina forestal, monte de abrigo y cerco: Muy bueno para cortina forestal y monte de abrigo.

Elegir plantas nativas para el arbolado urbano, cortinas forestales, montes de abrigo, forestación de rutas y el armado de parques es una opción valiosa en tanto son especies originarias del ecosistema y por tanto se desarrollan en armonía con las condiciones ambientales. Sin embargo, para su mejor desarrollo es necesario conocerlas para acompañar su crecimiento y saber qué esperar de su comportamiento.

Desde el INTA hemos elegido difundir once especies del noreste bonaerense y cada una se vuelca en una ficha técnica con información orientativa. El contenido fue elaborado por Rosana Gutiérrez, Marcela Sánchez y Alejandra Tálamo.

Más info: gutierrez.rosana@inta.gov.ar



Más información



intasanpedro

www.inta.gov.ar/sanpedro

