

## FICHA VARIETAL

Pera **Black Worcester**

Algunos autores sugieren que fue cultivada por los romanos durante el primer siglo D.C., y fueron ellos quienes la introdujeron a Inglaterra (2) en donde fue una importante variedad en el siglo XVI. Fue incorporada al escudo de armas de la ciudad de Worcester. Se la puede encontrar con la siguiente sinonimia: Black Pear of Worcester, Parkinson's Warden (1, 2, 3).

El árbol es vigoroso, muy productivo, de producción anual regular. Presenta una madurez muy tardía, en el Alto Valle alcanza el momento de cosecha a fin de marzo o principio de abril.

Tiene una floración intermedia. En nuestra zona el estado de plena floración se registra alrededor del 29 de septiembre. Las flores son de tamaño mediano, con pétalos ovalados de disposición intermedia, el estigma se encuentra al mismo nivel que los estambres.

El fruto es piriforme de base ancha, simétrico o ligeramente asimétrico, de tamaño mediano a grande. La epidermis es verde amarillenta con color superficial en tono rojo oscuro en una superficie pequeña (10-25%). Se caracteriza por una alta presencia de ruseting que puede cubrir completamente al fruto. El pedúnculo se encuentra inserto como una prolongación del eje, con curvatura muy débil, de longitud y grosor medio.

Se cita como una variedad con pulpa granulosa, dulce acidulada, desabrida y medianamente jugosa (1, 2, 3). La literatura la menciona como una variedad apta para usos culinarios (1, 2).

(1) Bunyard, E. A. 1920. A handbook of hardy fruits more commonly grown in Great Britain. John Murray, Albemarle Street, London.

(2) Hedrick, U.P., 1921: "The pears of New York – Report of the New York Experimental Station for the year 1921." J.B. Lyon Company, Albany, US.

(3) Welkerling de Tacchini E. 1967. Descripción de los Cultivares de Peral. Colección Agropecuaria N. 15. INTA.

