



VITICULTURA

HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - NOVIEMBRE 2023

PODA DE LA VID

En los viñedos tradicionales la poda de invierno es una de las labores de cultivo más importante. La poda define la cantidad de yemas que quedan en una planta. Esto condiciona a su vez el número de brotes y de hojas (superficie foliar), el número de racimos y la cantidad de reservas que potencialmente la planta podrá producir en la temporada.

Efectos de la poda de sarmientos en el cultivo de la vid

- Regula la producción de racimos y el crecimiento vegetativo.
- Mejora la producción de uva y la calidad de la uva.
- Favorece la obtención de cosechas uniformes a lo largo de los años.
- Mantiene la forma de las plantas y facilita el manejo del viñedo.



Tipos de yemas en la vid según su ubicación en el sarmiento.

Una poda de fructificación adecuada debe procurar dejar yemas fértiles y bien ubicadas sobre las estructuras permanentes de la planta.

El número de yemas francas dejadas después de la poda se denomina carga o riqueza de poda.

Poda equilibrada

Consiste en dejar un número de yemas compatible con el vigor de la planta para obtener un equilibrio entre el crecimiento vegetativo y la producción de uva.

Una carga excesiva (poda liviana) produce un mayor número de brotes y de racimos y reduce el vigor de los sarmientos.

Una poda intensa o severa genera pocos brotes muy vigorosos y una menor cosecha.

El podador, en base a la observación de la cantidad y calidad de los sarmientos producidos, deberá decidir si en la poda actual mantiene, aumenta o disminuye la carga con respecto a la poda del año anterior.

Cuándo podar

La poda de invierno se debe realizar durante el reposo vegetativo de las plantas, desde la caída de las hojas hasta la brotación de las yemas. Dentro de ese periodo, el momento oportuno de podar dependerá de cada viñedo en particular. De modo general, podas tempranas o tardías producen debilitamiento de las plantas. Podas en completo estado de dormición maximizan en el aprovechamiento de las reservas acumuladas. Podas muy tardías pueden retrasar la fecha de brotación por varios días.

Recomendaciones prácticas de la poda invernal

- Dejar madera de protección en todos los cortes.
- Respetar las yemas casqueras cuando se elimina un sarmiento.
- Tratar de realizar cortes solo en madera de 1 o 2 años.
- Aplazar y disminuir la necesidad de realizar podas de renovación (podas equilibradas y manejo del cultivo).
- Realizar cortes de poda a bisel en sentido contrario al último órgano conservado.
- Proteger los cortes grandes de poda con un fungicida (40 g de Oxiclورو de cobre + 1 L Látex).

Pablo CASTRO, Gabriel NAHUEL, Rubén OSORIO, Aldo GÓMEZ, Víctor GIMÉNEZ

castro.pablo@inta.gob.ar



Ministerio de Economía
Argentina

INTA EEA Rama Caída

📍 El Vivero S/N Rama Caída, San Rafael Mendoza. CP 5603

🌐 inta.gob.ar/ramacaída

