

SUELO FÉRTIL = PLANTAS VIGOROSAS y PRODUCTIVAS

 Debemos aplicar cada año en primavera 2 - 3 kg de abono por planta integrándolo al suelo con rastrillo.

 Durante el período de floración aplicamos medio litro de purín de ortiga por metro cuadrado.

Los nutrientes son el alimento que las plantas toman del suelo

Biofertilizante: Purín de ortiga

PREPARACIÓN: 1 kg de parte aérea de ortiga en 10 litro de agua fresca. Reposar por 2 semanas, revolviendo cada tanto. A las 2 semanas filtrar y envasar en recipientes preferentemente oscuros.

ALMACENAMIENTO: hasta 6 meses protegidos de la luz solar.



CONTACTOS INTA ProHuerta Río Negro

EEA Valle Inferior

AER Viedma: Teléfono: (02920) 423 474

AER Gral. Conesa: Teléfono: (011) 15 6793 5361

AER Valcheta: Teléfono: (02934) 493253

AER Río Colorado: Teléfono: (02931) 432 756

EEA Bariloche

AER Bariloche: Teléfono: (0294) 4422 731 – INT 259

AER Ing. Jacobacci: Teléfono: (02940) 432288

OT Los Menucos: Teléfono: (011) 15 68018506

AER El Bolsón: Teléfono: (0294) 4492422

Cultivo familiar de frambuesas

Incorporar plantas frutales en nuestra huerta nos permitirá mejorar la variedad de alimentos ricos y sanos para la familia y para compartir con los vecinos.

ALGUNAS RECOMENDACIONES para la INSTALACIÓN y MANEJO de los FRUTALES

RECEPCIÓN

 Debemos hidratar las plantas en un balde con agua unas horas previas a su implantación.

 Si no es posible plantar los frutales al recibirlos es conveniente resguardar las raíces tapándolas con tierra húmeda.

UBICACIÓN de las plantas

El distanciamiento entre plantas puede ser de 0,4 m -0,5 m en un sitio soleado, protegido del viento y heladas. Al segundo año ya podemos alcanzar 16 -18 varas por metro lineal.



PLANTACIÓN

-  Realizamos un pequeño pozo por cada planta.
-  Mezclamos la tierra de relleno con abono (compost, guano de chivo u oveja).
-  Colocamos las plantas y tapamos las raíces.
-  Apretamos la tierra con los puños para que no quede aire entre las raíces.



RIEGO

IMPORTANTE

El suelo debe permanecer siempre húmedo sin que se encharque porque **los frambuesos son muy sensibles al exceso de agua.**

Durante la época de **floración y fructificación** es necesario regar todos los días aplicando **5 litros de agua por planta.**

El resto de la temporada regamos cada 2 o 3 semanas.



PODA

Con la poda buscamos un equilibrio de las ramas fruteras, la aireación del cultivo y facilitar la cosecha de los frutos.


¿Cuándo realizar la poda? y ¿Qué ramas hay que podar?

De acuerdo a las variedades realizamos las siguientes podas:

 **Variedad reflorecientes** (2 floraciones en una temporada): Podamos luego de la **primera cosecha** se podan las cañas que fructificaron y en **primavera** se elimina la porción de la caña que ya fructificó.

 **Variedades no reflorecientes** (una floración en una temporada): Podamos inmediatamente luego de la cosecha podar al ras las cañas que ya fructificaron. También hay que realizar una selección de los brotes nuevos, quitando los más débiles de manera que queden finalmente entre 14 a 16 tallos por metro lineal.

Planta sin podar



Planta podada

