

FICHA VARIETAL

Pera Butirra Precoce

Fue obtenida en Florencia, Italia, por A. Morettini mediante el cruzamiento entre Coscia y Williams. Se introdujo en el cultivo en 1956 (1).

El árbol es vigoroso, medianamente productivo, poco precoz respecto a su entrada en producción. En el Alto valle presenta una madurez temprana, alcanza el momento de cosecha a fin de diciembre o principio de enero.

Tiene una floración temprana. En nuestra zona el estado de plena floración se registra alrededor del 22 de septiembre. Las flores son de tamaño pequeño, con pétalos circulares, de disposición intermedia, el estigma se encuentra por debajo de los estambres.

La forma del fruto es cónica- piriforme y ligeramente asimétrica, de tamaño pequeño. La epidermis amarilla desarrolla color superficial en un área mediana (25-50%) de un tono rojo claro. Pedúnculo de inserción oblicua, con curvatura débil, de longitud y grosor mediano.

Se cita como una variedad de pulpa jugosa, dulce con textura mantecosa (1).

(1) Brooks, R.M. and H.P. Olmo. 1997. The Brooks and Olmo register of fruit and nut varieties., 3rd ed. ASHS Press, Alexandria, VA. Browicz, K (1969) Amygdalus.

