

HOJA INFORMATIVA N°13

Octubre de 2020
Publicación irregular
ISSN en trámite

Recomendaciones generales para cultivar hortalizas, temporada primavera/verano

Oasis bajo riego, provincias de La Rioja y Catamarca



Agencia de Extensión Rural Chilecito
Estación Experimental Agropecuaria Chilecito
Centro Regional Catamarca - La Rioja



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

Recomendaciones generales para cultivar hortalizas, temporada otoño/invierno

Oasis bajo riego, provincias de La Rioja y Catamarca

Gaitán, Jorge O. y Carrizo, José E.
Agencia de Extensión Rural Chilecito

Berenjena (*Solanum melongena* L.)

Es una especie perenne, que se cultiva como anual en nuestra zona en razón de su sensibilidad al frío, puede alcanzar el metro de altura.

Existen numerosas variedades, pero en nuestro país se emplean en general las tipo violetas “medio larga” o “larga”.

Se consumen los frutos cocidos en diversas preparaciones y también en encurtidos.

Entre sus propiedades contiene nutrientes con propiedades antioxidantes como ácido clorogénico, vitaminas del grupo B1, es rica en minerales como magnesio, cobre, manganeso y además con un alto contenido en fibra.



Es una especie muy sensible al trasplante, por lo que se debe tener mucho cuidado con la humedad, siendo recomendable utilizar plantines en bandejas de germinación (*speedling*) u otro tipo de envase a los fines de evitar que el sistema radicular sufra daño por manipuleo.

También se recomienda que inmediatamente al proceso de plantación se riegue para proveer de la humedad necesaria, la que además deberá adecuarse durante los procesos de floración y fructificación, que son los que más agua requieren.

Labores culturales

Exige al igual que tomate una buena preparación de suelo a los efectos de acumular abundante cantidad de agua. Se recomienda escardillar un mes posterior al trasplante y treinta días más tarde realizar el aporque, que debe hacerse con precaución, para evitar roturas de raíces. Se recomienda plantar cuando hayan pasado los peligros de helada.

Enfermedades

Al final de la temporada y con condiciones de humedad elevada, suelen aparecer ataques de “Tizón temprano” (*Alternaria solani*) ó “Tizón tardío” (*Phytophthora capsici*). En cuanto a plagas pueden observarse ataques de “Bicho moro” (*Epicauta adspersa*).

Cosecha

Generalmente los frutos se cosechan cuando alcanzan su desarrollo final, que debe coincidir con su color definitivo (dependiendo de la variedad). Este proceso tiene una duración de 70-90 días posteriores al transplante.

Se suelen realizar entre 5 y 6 recolecciones, según la temperatura y tamaño final de la fruta.

[Recomendaciones generales para cultivar hortalizas, temporada primavera/verano. Oasis bajo riego, provincias de La Rioja y Catamarca](#) | octubre de 2020 | Cantidad de páginas: 3

Calendario con breves recomendaciones generales de labores a realizar

Berenjena

Julio/Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Siembra. Germinación óptima con temperatura de 25°C. Trasplante: plantines con alturas de 20 cm, en speedling u otro.	Trasplante. Fertilización de asiento. Carpir entre las líneas de plantación y aporcar a los 30 días.	Fertilización.	Cosecha: 70 a 90 días desde el trasplante.



Para más información, consultar en la Agencia de Extensión Rural más cercana a su domicilio o mediante Agencia Virtual

inta.gov.ar | Redes sociales



Consultáanos también por INTA Agencia Virtual

DISPONIBLE EN
Google Play

