



ENFERMEDADES MAS COMUNES DE LA CABRA



**Paraje Tosquea
Año 2008**



RETENCION DE PARES

Se dice que hay retención de pares cuando pasan 12 horas de parida la cabra y no larga las pares

¿Qué se ve en una cabra con retención de pares?

Se ven las pares colgando de la cabra
Además puede estar triste sin querer comer y con mucha fiebre

¡CUIDADO!



¡SU CABRA SE PUEDE MORIR DE ESTA ENFERMEDAD!

¿Cómo se pueden curar esta enfermedad?



Primero debemos ponernos guantes, para no tocar las pares directamente con las manos y evitar contagiarnos enfermedades graves



Luego debemos cortar las pares a la altura de la vulva

No se recomienda tironearlas porque podríamos lastimar la madre

Además, es importante que le pongamos Terramicina LA para evitar una infección



La terramicina se coloca en la pierna, 1 cm. Cada 10 kg

También se puede poner Estradiol para que se disuelvan las pares

SE LE SALE LA MADRE **(Prolapso de Matriz)**

Es una enfermedad en la que se sale la madre a través de la vulva de la cabra

¿Qué se ve en la cabra que se le sale la madre?

Se ve un bulto que cuelga de la cabra y que va cambiando de color.

Primero es rosado y luego se hace más oscuro.

¡CUIDADO!



SU CABRA SE PUEDE MORIR DE ESTA ENFERMEDAD!

¿Cómo se las puede curar?




- Hay que volver a meter la madre dentro de la cabra. Para eso habría que anestesiarse al animal si se puede.



- Luego ponerse guantes y lavar la madre y desinfectarla con iodo. Si no tenemos iodo podemos hacerlo con agua y jabón.
 - El agua debe estar tibia para que no se pasme la madre
- Para meter la madre hay que hacerlo con los puños cerrados, cuidando de que no se vuelva a ensuciar.



- Después hay que poner antibióticos para evitar la infección.
- Se inyecta en la pierna de la cabra Terramicina LA , 1 cm. Cada 10 kg.
- Para que no se vuelva a salir la madre debemos hacer puntos en la vulva, dejando espacio del tamaño de un dedo para que pueda orinar.



¡ATENCIÓN!

Se le puede volver a salir la madre en la próxima parición.

MASTITIS

Se llama mastitis a la inflamación de la ubre

¿Cómo se ve la enfermedad?


La cabra puede ponerse triste y no deja mamar al cabrito.

La ubre está caliente, inflamada y con dolor. A veces se pueden ver lastimaduras.



Cuando la ordeñamos la leche puede parecer normal o salir con sangre, pus y grumos.

Una vez que se va la enfermedad, la cabra puede perder la ubre o quedar con bultos en forma de pelotas duras.




¿Cómo se puede curar la cabra con mastitis?



- Para curarlas hay que ponerle antibióticos dentro de la ubre
- Hay que comprar jeringas especiales que vienen con antibióticos para colocar dentro de la ubre



- Antes de hacerlo tenemos que secar la ubre y lavar bien los pezones evitando que la jeringa se ensucie
- Debemos mantener la ubre sin leche por tres días y repetir el tratamiento si no se cura



- También podemos usar desinflamatorios y antibióticos inyectables

PIZOTA

Es una enfermedad muy contagiosa que produce costras y afecta a todos los animales de la majada

¡También puede afectar a las personas!

¿Qué se ve en una animal con pizota?

Se ven los cabritos con costras que rodean la boca

En los adultos se ven las costras en las ubres o en las patas



¿Se pueden morir los animales por esta enfermedad?




Muy pocos cabritos mueren, salvo cuando se presentan complicaciones ó se localiza en el interior del cuerpo (cuando la pizota se va para adentro)


¿Cómo se puede curar?



- Se pueden sacar las costras y poner vinagre mezclado con sal o glicerina iodada



- En caso que los cabritos dejen de comer ponerles antibiótico
- Existe una vacuna que se compra en las veterinarias pero como no está hecha con el mismo tipo de pizota de la zona, a veces no funciona



- También se puede hacer una vacuna casera para ponerle a toda la majada y evitar que la enfermedad sea muy grave

¿Cómo se hace la vacuna?

Primero debemos ponernos guantes para no contagiarnos la enfermedad

Luego se tienen que sacar las costras frescas (amarillentas) de los animales y mezclarlas con 1 tapita de vaselina y 1 tapita de agua destilada



Se debe moler la preparación hasta que se disuelvan las costras

Después se raspa, con un bisturí o gillette, el lado interno de la oreja o la verija (en un lugar donde no haya pelos)

Se moja el algodón en la mezcla preparada anteriormente y se lo pasa por la zona que se raspó

Esta vacuna debe hacerse a todos los animales del chiquero. Los cabritos se vacunan cuando ya tienen 20 días de edad y las cabras y cabrillonas una vez al año

PARASITOS DEL CUAJO

**Los parásitos producen una
disminución en la producción de los
animales y los predispone a otras
enfermedades**

¿Cómo se contagian los parásitos en la majada?

Se contagian a través de huevos que se eliminan con el guano de las cabras que contaminan los pastos del campo



¿Cómo se cura la enfermedad?

Hay que desparasitar a toda la majada en los meses de lluvia

Los antiparasitarios que se pueden usar son:

- Galgosantel 1 cc cada 10 o 20 kg. de peso entre cuero y carne
- Ivermectina 1 cc cada 50 kg. de peso

Hay que tener en cuenta que todos los años hay que cambiar el tipo de antiparasitarios para evitar el "acostumbramiento" y así tener siempre éxito en las desparasitaciones