

HOJA INFORMATIVA N°6

Julio de 2020
Publicación irregular
ISSN en trámite

Recomendaciones generales para cultivar hortalizas, temporada otoño/invierno

Oasis bajo riego, provincias de La Rioja y Catamarca



Agencia de Extensión Rural Chilecito
Estación Experimental Agropecuaria Chilecito
Centro Regional Catamarca - La Rioja



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

Recomendaciones generales para cultivar hortalizas, temporada otoño/invierno

Oasis bajo riego, provincias de La Rioja y Catamarca

Gaitán, Jorge O. y Carrizo, José E.
AER Chilecito - EEA Chilecito

CEBOLLA (*Allium cepa* L.)

Es una especie de la cual se consume el bulbo y la parte aérea como cebolla de verdeo; crudo, o cocido en diversas preparaciones, con un alto valor nutritivo y medicinal. Es una fuente de fibras, vitaminas, minerales; con propiedad digestiva y depurativa. Su destino para industria es numeroso, se produce encurtidos, deshidratados y forma parte de numerosos preparados para la alimentación. Se ha estimado un consumo promedio de 10 kg por persona por año.



Las cebollas se clasifican en tardías, intermedias y tempranas según la respuesta al fotoperíodo, se hará referencia en esta hoja informativa a **Valencianita** que se encuentra en el grupo de las tempranas. Esta variedad produce en general bulbos más pequeños que **Valenciana**, y se cosecha desde octubre a diciembre; puede resistir temperaturas de varios grados bajo cero. El tiempo estimado de inicio de cosecha es de 270 días

Requiere muy buena preparación del suelo, con un pH óptimo de 6, aunque en nuestra zona prospera con pH más alcalino lo que demuestra su gran adaptabilidad a diversas condiciones del suelo. Al ser una variedad de día corto necesita alrededor de 12 horas de luz para la formación del bulbo, cualquiera sea la fecha de trasplante.

Labores Culturales: exige *carpidas*, definiéndose el distanciamiento definitivo cuando se trasplanta, tener en cuenta que a mayor densidad se obtendrán bulbos pequeños. Si se emplea cultivador las distancias de plantación se recomiendan de 40 x 10 cm, ó 70 x 10 cm.

Se suelen utilizar herbicidas para el manejo cultural de las malezas, sobre todo en los cultivos por **siembra directa**:

1. En preemergencia: Pendimetalín (E33%), dosis de 2 a 3 litros por hectárea.
2. Cuando las cebollas tengan 2 o 3 hojas verdaderas se puede aplicar:
 - a. Linuron: (PM 50 %) 0,8 a 1 kg por hectárea.
 - b. Bromoxinil (E36%): 1 a 1,3 litros por hectárea.
 - c. Se puede alternar carpidas manuales con aplicación de herbicida post-emergente cada 30-40 días.

Reacciona bien con una fertilización nitrogenada de 200 kg de nitrógeno por hectárea durante el ciclo.

Plagas y enfermedades: En general esta especie puede ser afectada por “Podredumbre blanca” (*Sclerotium cepivorum*) para lo cual se recomienda rotación de cultivo, y hacer curaciones a la semilla.

Recomendaciones generales para cultivar hortalizas, temporada otoño/invierno. Oasis bajo riego, provincias de La Rioja y Catamarca | julio de 2020 | Cantidad de páginas: 3

Comenzando con la estación que transitamos (otoño), y en adelante, se dan algunas breves recomendaciones generales de las labores que deberemos realizar:

Cebolla

M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
	Sd	F	F	Tr	F Ca Her	F Ca					

Referencias:

Sd	Siembra directa
Sa	Siembra para almácigos
Tr	Trasplante
Fer	Fertilización
Es	Escardillado
Ra	Raleo
Ap	Aporque
Ca	Carpida
Co	Cosecha
De	Desmalezado
Her	Aplicación de Herbicidas

- ✓ La germinación óptima se da con 18°C de temperatura.
- ✓ El trasplante se realiza aproximadamente a los 3 meses de la siembra.
- ✓ Se recomienda fertilización nitrogenada en almácigo.



- ✓ Trasplante a distancia recomendada.
- ✓ Aplicación de herbicidas si fuera necesario y/o carpir.
- ✓ Cosechar si se alcanzó el tamaño adecuado y engavillar hasta el secado de hojas.

Para más información consultar en la Agencia de Extensión Rural más cercana a su domicilio o mediante Agencia Virtual

inta.gov.ar | Redes sociales    

Consultáanos también por INTA Agencia Virtual

DISPONIBLE EN
Google Play

